1917 — N° 9

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

Natura maxime miranda
in minimis.

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, VIe

1917

Le Bulletin paraît deux fois par mois.

Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les **membres** de la Société, le deuxième, pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales *de la Société entomologique de France*, années 1843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à 1895. . . . . 12 et 15 fr.
Annales (années 1896 à 1914). . . . . 25 et 30 fr.
Tables *des Annales* (**1832-1860**), par A.-S. Paris . 2 et 3 fr.
Tables *des Annales, de* **1861** *à* **1880**, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.
Tables *des Annales, de* **1881** *à* **1890**, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.
Bulletin *de la Société entomologique de France* (publication distincte des *Annales*, depuis 1896), années 1896 à 1915, chaque année . . . . . 18 fr.
Bulletin (numéros isolés), chaque. . . . . 1 et 1 fr.
Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. Nos). 5 et 5 fr.
L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.
L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement *par volume* (port compris). . . . . 10 et 12 fr.
Faune *des Coléoptères du bassin de la Seine*, par L. Bedel :
Vol. I (*Carnivora, Palpicornia*) . . . . . (*Épuisé*).
Vol. II (*Staphylinoidea*, 1re part.) (par J. Ste-Claire Deville). . . . . 3 et 4 fr.
Vol. IV, 1er fascicule (*Scarabaeidae*) . . . . . 4 et 5 fr.
Vol. V (*Phytophaga*). . . . . 8 et 10 fr.
1er fascicule seul. . . . . 3 et 4 fr.
2e fascicule seul. . . . . 5 et 6 fr.
Vol. VI (*Rhynchophora*). . . . . (*Épuisé*)
2e fascicule seul . . . . . 5 et 6 fr.
Catalogue raisonné *des Coléoptères du Nord de l'Afrique*, par L. Bedel, 1er fasc., pp. 1-208, in-8°, 1895-1900. . . . . 10 et 12 fr.
Mémoires entomologiques (*Études sur les Coléoptères*), par A. Grouvellé, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 et 4 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny 20 et 25 fr.
Les zoocécidies du Nord de l'Afrique, par C. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE *L'ABEILLE*

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Anc. Monde, par S. de Marseul, 1889, in-12 . . . . . 3 et 4 fr.
Catalogus Coleopterorum Europae et confinium, 1866, in-12. 0 fr. 50
Id. avec Index (*Suppl. au Catalogus*), 1877, in-12. 1 fr. 25
Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.
Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Méditerranée, par Peyron, 1877, in-12. . . . . 4 et 5 fr.
Mylabrides d'Europe (*Monogr. des*), par S. de Marseul, 1870, in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.; noires : . . . . . 4 et 5 fr.

Librairie de la Société entomologique de France (*suite*).

Silphides (*Précis des genres et espèces des*), par S. DE MARSEUL, 1884, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pselaphides et Scydmenides, par REITTER (trad. E. Leprieur), 1883, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces de l'Ancien Monde, par S. DE MARSEUL :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12. . . . . 1 et 2 fr.

Oedémerides (*Synopse des*), par GANGLBAUER (traduction de Marseul), 1887, in-12. . . . . 1 et 2 fr.

Ditomides (*Monogr. des*), par P. DE LA BRULERIE, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides (*Synopse des*), par E. LEFÈVRE (Appendice par DE MARSEUL), 1876, in-12. . . . . 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais et indo-chinois, par S. DE MARSEUL, 98 p., 1864, in-12. . . . . 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par DESBROCHERS DES LOGES, 1870, in-12. . . . . 1 50 et 2 fr.

Nanophyes (*Monogr. du genre*), par H. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1869, in-12. . . . . 1 50 et 2 fr.

Erotylides et Endomychides de l'Ancien Monde (*Revision des*), *d'après les travaux de M. E. Reitter*, 1889, in-12. . . 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus (*Monogr. du genre*), par HAROLD (traduction A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12. . . . . 0 fr. 50

Oxyporus (*Tableau synopt. du genre*), par A. FAUVEL, 1864, in-12. . . . . 0 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde (*Monogr. des*), par S. DE MARSEUL, 120 p., 1877, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Trichopterygiens (*Synopse des espèces de*), par MATTHEWS 75 p., 1878, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Apionides (*Monographie des*), par WENCKER, 162 p., 1864, in-12 . . . . . 4 et 5 fr.

Téléphorides (*Monographie des*), par S. DE MARSEUL, 108 p., 1864, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux Stenosis, par ED. REITTER, in-12, 50 p. (Extr. Gazette ent. Allem., XXX, 1866). . . . . 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. SIGNORET, in-8°, 3 p., 1 pl. col. (Extr. Tijdschr. voor. Ent., vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.]

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

M. **G. Melou**, 26, rue du Fort-Melville, à Diégo-Suarez (Madagascar) serait heureux d'entrer en relation avec entomologistes pour la détermination d'Insectes malgaches de tous les ordres (sauf les Lépidoptères) : échangerait Insectes de tous les groupes contre bon vérascope Richard et plaques, microscope, livres récents d'entomologie, ornithologie, conchyliologie ou autres ouvrages scientifiques intéressants, ou revues littéraires illustrées. — Base d'appréciation : 0 fr. 50 l'exemplaire.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

Mlle C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (Ve).

Envoi du tarif sur demande.

La station viticole de Villefranche (Rhône) demande un Entomologiste qui s'intéresserait à l'étude et à l'élevage des Ichneumons. — Adresser les offres à **M. Vermorel**, directeur de la station.

En vente actuellement au Cabinet entomologique **E. Le Moult**, 4, rue Duméril, Paris 13e, la meilleure marque d'épingles à Insectes existant dans les pays alliés (marque « Asta »).

Épingles blanches : 5 fr. 50 le mille.
— — 6 — — par boîtes de 500.

Algérie. — Réception assurée de jolis lots de Coléoptères du Sud Algérien, parmi lesquels : *Prionotheca*, *Polyphylla*, *Cleonus*, *Micipsa*, *Sepidium*, *Julodis*, *Scaurus*, etc. ; contre envoi à M. **Labrousse**, sous-chef de section des Chemins de fer, Aïn-Sefra (Sud-Oranais), de timbres-postes pour collection, neufs ou oblitérés, en très bon état (c'est-à-dire non déchirés, dentelures ou marges complètes, oblitérations propres). — (Timbres anciens de France, des colonies françaises et tous timbres-postes étrangers, sauf les trop communs qui servent à l'affranchissement de la correspondance courante).

M. A. Bayard, 20, avenue Aubert, à *Vincennes* (Seine), serait reconnaissant à ceux de ses collègues qui pourraient lui procurer, vivants, des Blattes, Blaps et Courtilières, ou lui indiquer un chasseur.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 9 mai 1917

Présidence de M. le Dr P. MARCHAL, Vice-Président.

M. Maurice Pic, de Digoin, et M. A. Hoffmann, récemment admis, assistent à la séance.

Correspondance. — M. P. Chrétien, lauréat du prix Passet (1915 et 1916), adresse la lettre suivante :

Monsieur le Président,

Répondant à l'invite, conçue en termes si élogieux et si bienveillants pour moi, de M. le Rapporteur de la Commission du prix Passet, la Société entomologique vient de m'accorder une distinction qui m'honore grandement. Je l'assure de toute ma gratitude.

Ayant conscience de mon faible mérite, je vois surtout dans cette manifestation la preuve que la Société attache une grande importance à l'étude des larves et qu'elle sait apprécier et encourager les efforts que l'on fait pour les découvrir. La Société a raison : un insecte n'est vraiment bien connu que s'il l'est sous tous ses états.

Je suis heureux aussi de pouvoir dire publiquement combien je suis reconnaissant à plusieurs de nos collègues de l'aide que j'ai reçue d'eux dans la recherche et la publication des premiers états de *Cimelia margarita.*

Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien transmettre mes sincères remerciements à la Société, et agréer l'expression de mes sentiments respectueux et dévoués.

P. Chrétien.

— M. P. Marie, récemment admis à titre de membre assistant, remercie la Société de son admission.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de bonnes nouvelles de MM. le Dr A. Clerc, M. Grosclaude et P. Vayssière.

Nous avons eu le plaisir de voir le capitaine J. Achard, en permission à Paris.

Changements d'adresses. — M. É. Boudier, 43, rue du Foix, Blois (Loir-et-Cher).

— Captain Malcolm Burr, United University Club, Pall Mall Road, London S.W. [actuellement à Salonique].

— M. le capitaine R. Léon-Dufour, dépôt du 8e dragons, Luçon (Vendée).

— M. Carlos Moreira, Museu Nacional S. Christovaõ, Rio de Janeiro (Brésil).

Admissions. — M. Auguste Bouchard, contrôleur des fabrications de l'Aviation militaire, 2, rue Émile-Deschanel, Paris XVIe. — *Coléoptères.*

— MM. Alain Étienne, étudiant, 4, rue Joseph Bara, Paris VIe, et Roland Guérin de Vaux, étudiant, 45, rue de Beaune, Paris VIIe, sont admis à titre de membres assistants.

Présentation. — M. Cl. Merle, 29, avenue Président Faure, à St-Etienne (Loire), présenté par M. J. Clermont. — Commissaires-rapporteurs : MM. J. Magnin et M. Pic.

Collections. — M. J. Clermont annonce que les collections de Coléoptères paléarctiques d'Amédée Champenois, récemment décédé, ont été acquises par notre collègue M. Henri Galibert, de Castres.

Dépôt des Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le 4e trimestre des *Annales* de 1916, comprenant les pages 401-632.

Communications

Description d'un *Luperus* nouveau du Maroc

[Col. Chrysomelidae]

par V. Laboissière.

Luperus (Calomicrus) Mercurini, n. sp. — Jaune paille, rougeâtre sur le vertex et plus clair sur les élytres; antennes et tarses rembrunis; labre noir.

Tête moins large que le pronotum, jaune paille dans sa partie inférieure, rougeâtre à partir du sillon surantennaire; sommet des mandibules, palpes en majeure partie et labre noirs. Carène faciale fortement ponctuée à sa base, son sommet lisse et se confondant avec les calus surantennaires; ces derniers nettement séparés par un sillon qui remonte sur le vertex; sillon transversal, délimitant le vertex, bien net; vertex brillant, avec quelques points épars très fins. La face antérieure de la tête porte quelques poils blancs. Antennes atteignant la moitié de la longueur du corps, brun clair, avec le dessus des 1er et 2e articles et la base et le sommet des suivants noirâtres; 2e et 3e articles peu allongés égaux, 4e presque aussi grand que les deux précédents réunis, mais plus large; les suivants un peu moins longs et moins larges, tous recouverts d'une fine pubescence grise.

Fig. 1.

Pronotum transversal, très fortement rétréci en arrière; angles antérieurs aigus, arrondis, les postérieurs obtus; chacun d'eux avec un pore sétigère; surface brillante, ponctuée près des bords antérieur et latéraux, coupée transversalement dans son milieu par un large sillon plus profond de chaque côté, ce qui la fait paraître bifovéolée; bords latéraux et postérieur nettement rebordés, le dernier arrondi.

Écusson triangulaire et très petit.

Élytres d'un jaune pâle faiblement nuancé de verdâtre; plus larges à leur base que le pronotum et s'élargissant jusqu'aux trois quarts de

leur longueur pour s'arrondir ensuite; dessus densément et assez grossement ponctué, les intervalles ruguleux vers la suture; moitié postérieure avec de petits poils courts blanchâtres; suture faiblement rembrunie.

Dessous du corps jaune testacé, ponctué et garni de poils blancs peu denses; pattes de la couleur des élytres, avec les tarses bruns, plus foncés au sommet des articles, ainsi que l'extrémité des tibias; tibias et tarses recouverts de poils gris clair.

Long. 3,5 mm. (sans tenir compte de l'abdomen qui dépasse les élytres). — Larg. 1,75 mm., dans le plus grand diamètre des élytres.

Ce nouveau *Luperus* se place à côté de *L. Wollastoni* Païva, mais chez ce dernier l'abdomen est noir, la teinte du dessus plus rougeâtre, les antennes rougeâtres à la base et brun rougeâtre au sommet; en outre le sillon interantennaire ne dépasse pas le sillon transversal, et le sillon prothoracique est accusé uniformément dans toute sa longueur.

Maroc oriental : Maharidja, juillet 1914, un seul individu ♀ (collection Laboissière).

Nous dédions cette espèce au capitaine Mercurin qui l'a récoltée et nous l'a offerte.

Deux nouveaux *Cantharis* L. de Chine

[Col. Malacoderm.]

par Maurice Pic.

Les deux espèces décrites ici ont été récoltées dans le Nord de la Chine par feu Fortune et font partie de ma collection.

Cantharis podabriformis, n. sp. — *Elongata, subparallela, nitida, pallido-testacea, oculis, antennis, articulis primis exceptis, geniculis abdomineque pro parte nigro-piceis, elytris griseo-subaeneis.*

Allongé, subparallèle, brillant, testacé pâle, avec les antennes, moins leur base qui est testacée, les genoux et la majeure partie de l'abdomen d'un noir de poix; élytres métalliques, d'un gris légèrement bronzé. Tête plus large que le prothorax, un peu rétrécie derrière les yeux qui sont saillants. Antennes grêles. Prothorax allongé, presque droit sur les côtés, sillonné au milieu. Écusson un peu impressionné. Élytres un peu plus larges que le prothorax, assez

longs, subparallèles, ruguleux mais un peu brillants, à pubescence grise. Pattes grêles. — Long. 10 mm.

Nord de la Chine.

Ressemble à *C. flavicornis* Gorh., mais tête moins rétrécie en arrière et entièrement testacée, prothorax moins long, genoux noirs, etc.

Cantharis subaeneipennis, n. sp. — *Parum elongata, subparallela, nitida, nigra, thorace lateribus et abdomine pro parte testaceis; elytris metallicis, nigro-subaeneis.*

Peu allongé, subparallèle, brillant, noir, avec les côtés du prothorax largement et l'abdomen testacés, ce dernier maculé de foncé, élytres d'un noir un peu bronzé. Tête à peine plus large que le prothorax. Antennes grêles Prothorax subcarré, subsinué sur les côtés, faiblement sillonné. Élytres un peu plus larges que le prothorax, pas très longs, subparallèles, ruguleux mais un peu brillants; pattes assez grêles, foncées. — Long. 8 mm.

Nord de la Chine.

Moins allongé que le précédent; prothorax plus court et largement foncé au milieu.

Nouvelle race d'*Euchloë ausonia* Hb. (*belia* Cr.) [Lep.]

par le comte Emilio Turati.

La conquête de la Libye va bientôt nous permettre d'enregistrer de nouvelles découvertes dans le domaine lépidoptérologique.

A en juger par les quelques spécimens qui ont été recueillis dans cette région à tout hasard par des amateurs militaires ou religieux, et que MM. le Dr A. Fiori, de Bologne, et G. Ginnelli de Turin, ont eu l'obligeance de me communiquer, il semble que les Lépidoptères s'y rattachent à deux faunes distinctes : la faune tripolitaine, qui est bien en continuation de la faune maurétanique de Tunisie et d'Algérie, et la faune cyrénéenne, qui tient plutôt de la faune de Syrie.

Dès maintenant, il me semble intéressant de faire connaître la première génération (vernale) de la race d'*Euchloë ausonia* Hb. (*belia* Cr. que l'on rencontre à Benghasi; forme bien distincte de toutes les autres, si nombreuses pourtant, que l'on connaît aujourd'hui.

De l'*Euchloë ausonia* Hb. de Libye, que je nomme **libyca**, n. var.,

j'ai vu trois mâles identiques, recueillis au mois de février. Ils ont une tout autre apparence que la forme *melanochloros algirica* Oberthür (gener. vern.) qui, d'après Lord Rothschild (Nov. ent., XXI, p. 304) varie fortement, et ils ressemblent plutôt à *triangula* Verity, de Syrie, et *aegyptiaca* Verity dont ils ont la taille et à peu près la coupe des ailes.

C'est peut-être la plus petite forme connue, car son envergure mesure à peine 34 mm.

La coupe de ses ailes antérieures, plus étroite dans la transversale de la côte, à l'angle extérieur, et plus allongée, a aussi l'apex plus aigu que d'ordinaire.



Fig 1.

La partie noire apicale, très descendue, s'étend vers le milieu de l'aile, légèrement saupoudrée d'écailles blanches et se terminant par une ligne presque droite, moins évasée que d'ordinaire. Elle renferme la tache blanche subapicale, à peu près rectangulaire, qui se détache de la côte; et trois points blancs allongés distalement, nettement marqués, qui se terminent dans le blanc des interstries de la frange.

La côte est parsemée de rares écailles noires.

La base des quatre ailes a une ombre noire très réduite.

La tache noire cellulaire, à peu près rectangulaire, qui part directement de la sous-costale sans diffusion ni prolongement du noir à sa base, est divisée en deux par une mince ligne blanche, et rappelle ainsi la forme sicilienne *Kruegeri* Turati.

Les ailes postérieures laissent transparaître, comme d'ordinaire, les ramages du dessous. Ces derniers sont d'un vert vif et intense, finement saupoudrés de jaune, très diffus, sans pourtant ressembler à ceux de *tagis* Hb., *bellezina* B. ou *insularis* Stdgr, et ont les points blancs nacrés plus réduits que dans toutes les autres formes d'*ausonia* Hb., y compris *matutia* Turati.

Le vert du dessous de l'apex est aussi très vif et intense.

Sur le dessus des ailes postérieures, à l'angle extérieur on remarque une ou deux ombres noires à l'extrémité des côtes.

Touffe de poils très longs et saillants sur le front.

Antennes courtes et minces.

Abdomen gris noir sur la région dorsale, blanc sur la région ventrale.

La forme *libyca* se distingue donc au premier abord et entre toutes, indépendamment de sa taille très petite, par la coupe étroite et aiguë de ses ailes antérieures, par ses larges parties apicales de forme triangulaire, à base presque droite, et par la macule cellulaire à peu près rectangulaire inférieurement et partagée au milieu par un filet blanc.

Bulletin bibliographique

Bargagli (P.) : Insetti commestibili. (*Rivista europ.*, (8) 11, 5, 1877.) 11 p. — Don de M. J. de Gaulle.

Id. : Di alcuni insetti nocivi ai rami di querce, di cerro et di leccio. (*Res. Soc. ent. ital.* 1878, p. 6-9.). — Id.

Bolivar (C.) : Silfidos cavernicolas de la región de Castro-Urdiales (Santander). (*Bol. Real Soc. esp. Hist nat.*. XVII (1917), p. 207-211) fig.*

Calwer (C.-G.) : Käferbuch. 700 p., 50 pl. — Don de M. H. Desbordes.

Des Gozis (Maurice) : Recherche de l'espèce typique de quelques anciens genres. Montluçon, 1886. 36 p. — Don de M. J. de Gaulle.

Divers : Caccie ed escursioni (*Bull. ent.*, VI [1874]), 9 p. — Don de M. J. de Gaulle.

Dominique (J.) : Catalogue des Orthoptères de la Loire-Inférieure. (*Bull. Soc. Sc. nat. O. Fr.* [1893], p. 71-93.) — Id.

Gobert (E.) : Catalogue des Diptères de France, Caen [1887], 88 p. — Don de M. H. Desbordes.

Grouvelle (A.) : Nitidulidae des îles Philippines récoltés par C.-F. Baker, 11. (*Philipp. Journ. Sc.*, XI [1916], p. 313-316.)*

Id. : Description d'un *Litargus* nouveau d'Afrique. (*Bull. Soc. ent. Fr.*, [1916], p. 278-280.)*

Hahn (L.) et Lefèvre (Éd.). : Animaux invertébrés. (*Dict. encycl. Sc. méd.*, p. 291-403.) — Don de M. J. de Gaulle.

LATREILLE (P.) : Cours d'entomologie, atlas, 1831; 24 pl. et explications. — Don de M. H. Desbordes.

PUTON (A.) : Catalogue des Hémiptères de la faune paléarctique (Hétéroptères). Caen [1886], 100 p. — Id.

Canadian Entomologist (The), XLIX [1917], 4. — SLADEN (F.-W.-L.) : Collecting wasps and bees; p. 113. — WALKER (E.-M.) : Dragonflies from Prince Edward island; p. 117. — WEISS (H.-B.) : The status of *Lecanium corni* in New Jersey; p. 119. — BIRD (H.) : New species and histories of *Papaipema*; p. 121, pl. 8. — GIRAULT (A.-A.) : Occurrence of *Parachrysocharis* in the United States; p. 129. — NEEDHAM (G.-J.) : The insect drift of Lake Shores; p. 129. — BLATCHLEY (W.-S.) : New and noteworthy Coleoptera from Florida; p. 137. — COCKERELL (T.-D.-A.) : Some Euglossine bees; p. 144. — MUIR (F.) : Synonymy of *Delphax maidis* Ashm.; p. 147. — JOHNSTON (C.-W.) : A new maritim Anthomyid (Dipt.); p. 148.

Entomological News, XXVIII [1917], 4. — DIETZ (W.-G.) : Key to the North American species of the *tricolor* group of the Dipterous genus *Tipula* L.; p. 145, pl. 11. — HARRISON (J.-W.-H.) : Egg-masses of the vaporer moths wanted; p. 151. — REHN (J.-A.-G.) : On *Coelophyllum simplex* and certain of its allies (Orth.); p. 152; pl. 12. — WOLCOTT (G.-N.) : Influence of rainfall on abundance of a moth; p. 161. — SHINJI (G.-O.) : Mating habit of the cottony cushion scale (Hem.); p. 162. — CHAMBERLIN (W.-J.) : Notes on some Buprestidae of Northern California; p. 166. — NEEDHAM (J.-G.) : Notes on some recent studies of dragonfly wing tracheation; p. 169. — HUNGERFORD (H.-B.) : The egg laying habits of a back-swimmer (Hem.); p. 174, pl. 13. — BUCHHOLZ (O.) : A new species of *Acronycta*; p. 183. — GOE (W.-T.) : Adult Chrysopidae do eat; p. 184. — PORTER (B.-A.) : The host of *Ablerus clisiocampe* Ash. (Hym.); p. 186.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. CHOPARD.

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. ALLUAUD et R. JEANNEL, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. ALLUAUD et R. JEANNEL.

Crustacés : I, *Phyllopoda*, par E. DADAY DE DEÉS. — II, *Amphipoda*, par E. CHEVREUX.

Arachnides : I, *Opiliones*, par le Dr C.-Fr. ROEWER, avec 1 pl. n. — II, *Ixodidae*, par L.-G. NEUMANN. — III, *Araneae* (1re partie), par L. BERLAND.

Hémiptères : I, *Pentatomidae*, par le Dr R. JEANNEL, avec 4 pl. n. — II, *Naucoridae*, *Belostomidae* et *Nepidae*, par A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : par le Dr R. JEANNEL, avec 1 pl. n.

Coléoptères : I, *Pselaphidae*, par A. RAFFRAY. — II, *Onthophagini*, par H. D'ORBIGNY. — III, *Meloidae*, par M. PIC, avec 1 pl. col. — IV, *Hylophilidae* et *Anthicidae*, par M. PIC, avec 1 pl. n. — V, *Hybosorinae*, etc., par E. BENDERITTER, avec 1 pl. n. — VI, *Buprestidae*, par Ch. KERREMANS, avec 1 pl. col. — VII, *Lampyridae*, par E. OLIVIER. — VIII, *Hispinae*, par R. GESTRO, avec 1 pl. n. — IX, *Dascillidae*, etc., par M. PIC. — X, *Anthribidae*, par K. JORDAN. — XI, *Histeridae*, par H. DESBORDES. — XII, *Dynastinae*, par E. BENDERITTER, avec 1 pl. n.

Hyménoptères : I, *Proctotrupidae*, *Cynipidae*, etc., par J.-J. KIEFFER. — II, *Formicidae*, par le Dr F. SANTSCHI, avec 2 pl. n. — III, *Chrysididae* et *Vespidae*, par R. DU BUYSSON. — IV, *Braconidae*, par GY. SZÉPLIGETI.

Diptères : I, *Chironomidae* et *Cecidomyidae*, par J.-J. KIEFFER. — II, *Nematocera*, par F.-W. EDWARDS. — III, *Polyneura*, par P. RIEDEL. — IV, *Anthomyiidae*, par P. STEIN. — V, *Brachycera*, par Th. BECKER, avec 2 pl. n.

Lépidoptères : I, *Chenilles des galles*, par F. LE CERF, avec 2 pl. n.

Orthoptères : I, *Dermaptera*, par A. BORELLI, avec 2 pl. n. — II, *Mantidae*, par L. CHOPARD.

Pseudonévroptères : I, *Termitidae*, par V. SJÖSTEDT. — II, *Odonata*, par R. MARTIN, avec 3 pl. n.

Névroptères : *Planipennia*, etc., par L. NAVÁS.

Myriapodes : I, *Chilopoda*, par H. RIBAUT, avec 5 pl. n. — II, *Symphyla*, par H. RIBAUT, avec 2 pl. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. VIRIEUX, avec 2 pl. n.

Vers : *Turbellariés*, *Trématodes* et *Gordiacés*, par P. DE BEAUCHAMP, avec 1 pl. n. — II, *Oligochètes*, par MICHAELSEN, avec 1 pl. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le Dr J. PELLEGRIN, avec 1 pl. n.

La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon LHOMME, 3, rue Corneille, Paris (VIe).

Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par F. Walker. London, 1869, in-8°. . . . . 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères d'Europe, in-8°, Moulins. (Extr. Rev. sc. Bourb.) :

I. *Nécrophages*, traduit de Reitter [par M.-J. Belon], 1890. . . . . 1 fr.

II. *Colydiides, Rhysodides, Trogositides* (traduit de Reitter), 1891. . . . . 0 fr. 50

Histérides nouveaux (Description d'), par S. de Marseul. in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.). . . . . 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de Bonvouloir, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 planches gravées. . . . . 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Ragonot, in-8°, 276 p., 4 pl. color. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1890). . . . . 10 et 12 fr.

Le même, pl. noires. . . . . 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae *et* Galleriidae, par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1888). . . . . 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlepidoptères et description d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ragonot. in-8°, 66 p., 1 pl. color. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1894). . . . . 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch. Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1895). . . . . 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae, by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p . . . . . 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae, by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p. . . . . 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in-4°, 52 p. (Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. l. n. d. 5 et 6 fr.

Genera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray, in-8°, 621 p., 3 pl. (Extr. des *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1903). 20 et 25 fr.

Pour les *Membres* de la Société, les offres d'échanges, demandes de communications ou de renseignements d'ordre *purement scientifique*, qui n'excéderont pas *cinq* lignes, seront insérées *gratuitement* dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont pas *dix* lignes, elles coûteront 0 fr. 20 la ligne pour deux numéros.

La Société entomologique de France tient ses séances les 2e et 4e mercredis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, *rue Serpente*.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par an avec planches et figures);

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colonies françaises, paient une cotisation annuelle de. . . . . 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient. . . . . 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans) qui paient une cotisation annuelle de. . . . . 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie. Il n'a plus de cotisation à payer, reçoit *franco* les *Annales*, le *Bulletin*, et, *à titre de prime gratuite*, une série de dix volumes des *Annales* parmi ceux à *prix réduit* restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et consécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les *mardis*, *jeudis* et *samedis*, de 3 heures à 6 heures 1/2; le *mercredi, de 8 à 10 heures 1/2 du soir.*

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE MARSEUL, continué par la **Société entomologique de France**, publie spécialement des travaux sur les COLÉOPTÈRES de l'Ancien Monde.

M. L. BEDEL, *20, rue de l'Odéon*, est chargé de la publication du Journal (*examen et admission des mémoires et correspondance scientifique*).

Le montant des abonnements **L'Abeille** (à 10 fr. ou 12 fr. *par volume*) doit être adressé à M. J. MAGNIN, Bibliothécaire adjoint de la Société entomologique, *28, rue Serpente*.

COLLECTIONS

Collection H. Sénac (*Tenebrionidae paléarctiques*),
Collection Ch. Brisout de Barneville (*Coléoptères paléarctiques*),
Collection Vauloger (*Anthicidae, Malachiidae, Erodiidae*),
chez M. L. BEDEL, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff (*Microlépidoptères*),
Collection H. Brisout de Barneville (*Coléopteres d'Europe*),
Collection Aubé (*Coléoptères paléarctiques*),
Collection Capiomont (*Hyperidae, Lixus, Larinus*),
Collection Vauloger (*Helopidae*).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé (*Diptères de France*),
Collection de Diptères de France, don de M. le Dr Gobert,
Collection A. Cheux (*Lépidoptères de France*),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d'exemplaires *typiques*,
au Siège social, 28, rue Serpente.

SOMMAIRE DU N° 9

Séance du 9 mai 1917

Correspondance (Prix Passet). 157
Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Changements d'adresses. — Admissions. — Présentation. — Collections. — Dépôt des Annales. 158

COMMUNICATIONS

V. LABOISSIÈRE. — Description d'un *Luperus* nouveau du Maroc [COL. CHRYSOMELIDAE]. 159
M. PIC. — Deux nouveaux *Cantharis* L. de Chine [COL. MALACODERM.] 160
Emilio TURATI. — Nouvelle race d'*Euchloë ausonia* Hb. (*belia* Cr.) [LEP.]. 161

Bulletin bibliographique. 163

Pour la *correspondance scientifique*, les *réclamations* et les annonces s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6e.

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET Cie. — PARIS.